



Dotazník

Sekce porodnické analgezie a anestezie 2010

Určeno primářům a přednostům oddělení a klinik anesteziologie a resuscitace všech nemocničních zařízení v ČR.

Celkový počet porodů ve Vaší nemocnici v roce 2009:

I. Porodnická anestezie

Počet operačních porodů celkem

Sectio Caesarea (SC)

Forcipem/vakuumextraktor

Zastoupení RA u císařského řezu:

Epidurální anestezie (EA)

Subarachnoidální anestezie (SA)

Kombinovaná SA/EA

Zastoupení CA u císařského řezu:

Počet elektivních výkonů v CA

Počet akutních výkonů v CA

Počet konverzí z RA na CA

Pro **plánované SC v RA** jsou používána tato anestetika:

.....

.....

Pro **akutní SC v RA** jsou používána tato anestetika:

.....

.....

Pro **SC v CA** jsou používána tato anestetika:

.....

.....

.....

.....

RA = regionální anestezie, CA = celková anestezie

II. Přítomnost otce u porodu

Rutiní přítomnost otce u císařského řezu: ano ne

Pokud je odpověď **ne**, důvodem bývá nesouhlas: porodníka pediatra anesteziologa

III. Porodní analgezie (metody používané ve Vaší nemocnici):

Nefarmakologické metody:

Hydroanalgezie ano ne

Akupunktura/akupresura ano ne

TENS ano ne

Audioanalgezie ano ne

Aromaterapie ano ne

Homeopatie ano ne

Systémová analgezie:

Pethidin ano ne

N₂O ano ne

Jiný druh analgezie:

.....

.....

Regionální analgezie (počet aplikovaných):

Pudendální analgezie

Paracervikální analgezie

Epidurální analgezie

Subarachnoidální analgezie

Kombinovaná SA/EA analgezie

Je používána tato epidurální analgetická směs:

.....

.....

Je dostupný non-stop 24hod. servis pro podání epidurální analgezie: ano ne

Přidání další dávky do epidurálního katetru provádí: anesteziolog anesteziologická sestra
porodník porodní asistentka

Neuroaxiální analgezie u porodu je hrazena: zdravotní pojišťovnou přímou platbou rodičkou
Pokud je přímá platba za podání neuroaxiální analgezie u porodu, pak činí Kč

VI. Časná poporodní anestezie ve III. době porodní: manuální vybavení placenty, poporodní revize apod.

Počet časných poporodních výkonů

V regionální anestezii:

Používaná anestetická směs:

v epidurální anestezii

subarachnoidální anestezii

.....

.....

V celkové anestezii:

Používaná kombinace anestetik:

bez intubace (se spontánní ventilací) :

s laryngeální maskou:

s intubací

.....

.....

.....

V. Regionální anestezie/analgezie a antikoagulancia

Požadovaná vyšetření před podáním regionální anestezie u rodičky bez anamnézy zvýšené krvácivosti:

Krevní obraz ano ne

Trombocyty ano ne

Jiné:

INR + APTT ano ne

Velké hemokoagulační vyšetření ano ne

Vyžadované časové odstupy při podání preventivní dávky LMWH (v hodinách) :

LMWH - epidurální punkce

LMWH - subarachnoidální punkce

LMWH - vytažení epidurálního katetru

Epidurální punkce - LMWH

Subarachnoidální punkce - LMWH

Vytažení epidurálního katetru...LMWH

Přesný název a adresa Vaší nemocnice, včetně kraje:

Telefonní spojení:

e-mail/www: